

## TYP

**IDIOPATYCZNY**

## OPIS

Obrzęk i/lub pokrzywka utrzymujące się powyżej 6 tygodni. Należy wziąć pod uwagę zaburzenie czynności tarczycy.

## TYPOWE OBJAWY

Obrzęk może wystąpić w dowolnym miejscu i może mu towarzyszyć pokrzywka.

## UKŁAD DOPEŁNIACZA

Prawidłowy

## MOŻLIWE LECZENIE (PRODUKTY LECZNICZE ZATWIERDZONE PRZEZ FDA I/LUB EMA)\*

W pierwszym rzędzie leki przeciwhistaminowe. DHEA. l-tyroksyna na zaburzenie czynności tarczycy. Leczenie prednizonem.

\* Pacjenci, u których występują nawet najłżejsze objawy obrzęku gardła muszą zostać poddani niezwłocznemu leczeniu, aby nie dopuścić do niedrożności dróg oddechowych. Piśmiennictwo medyczne i doświadczenie lekarskie wskazują, że kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe i epinefryna nie są skuteczne w leczeniu obrzęku naczynioruchowego spowodowanego niedoborem inhibitora C1. Jednakże, w niedawno opublikowanym badaniu odnotowano pozytywny wynik zastosowania wziewnej epinefryny w celu zapobieżenia całkowitej niedrożności dróg oddechowych. UWAGI: Obecność pokrzywki związanej z obrzękiem naczynioruchowym zwykle wskazuje na rozpoznani inne, niż HAE lub AAE.